

ALPRAZOLAM TABLETAS 1 MG USP



COMPOSICIÓN:

Cada tableta recubierta contiene:

Alprazolam USP 1 mg

Excipientes c.s.

INDICACIONES:

- El alprazolam es un medicamento tranquilizante (ansiolíticos) que pertenece al grupo de las benzodiazepinas.
- Este medicamento está indicado en el tratamiento de estados de ansiedad generalizada.
- Las benzodiazepinas sólo están indicadas para el tratamiento de un trastorno grave, que limita la actividad del paciente o lo somete a una situación de estrés extrema.
- Alprazolam no está recomendado para el tratamiento de la depresión.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Tratamiento de estados de ansiedad generalizada y ansiedad asociada a síntomas de depresión

Dosis inicial: de 0,25 mg a 0,5 mg tres veces al día.

El rango habitual oscila entre 0,5 mg hasta un máximo de 4 mg al día, repartido en 3-4 dosis.

Tratamiento de trastornos por angustia

Dosis inicial: de 0,5-1 mg al acostarse. Posteriormente la dosis debe ajustarse por su médico en función de la respuesta. Los ajustes de dosis deben realizarse mediante incrementos no superiores a 1 mg cada 3 o 4 días. Pueden añadirse dosis adicionales hasta alcanzarse el esquema posológico de 3 o 4 veces al día.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. Esto es especialmente importante porque el uso simultáneo de más de una medicina puede aumentar o disminuir su efecto.

Toma de alprazolam con alimentos, bebidas y alcohol

Durante el tratamiento evite las bebidas alcohólicas. El efecto del alcohol puede potenciar la sedación.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar alprazolam. Antes de comenzar el tratamiento asegúrese de que su médico sabe si usted:

- Tiene algún trastorno de pulmón, de hígado o de riñón;
- Si se ha sentido o se siente tan deprimido que ha tenido pensamientos o ideas de suicidio;
- Si tiene antecedentes de consumo de drogas y alcohol.

Después del uso continuado de alprazolam puede detectarse cierta pérdida de eficacia (tolerancia). Consulte a su médico o farmacéutico si durante el tratamiento nota síntomas de manía (estado de sobreexcitación, sensación de euforia o hiperirritabilidad) o hipomanía (estado de excitación y actividad exagerada).

Las benzodiazepinas pueden ocasionar una pérdida de memoria y reacciones tales como: intranquilidad, agitación, irritabilidad, agresividad, delirios, ataques de ira, pesadillas, alucinaciones, psicosis, comportamiento inadecuado y otros efectos adversos sobre la conducta.

Al cesar el tratamiento con alprazolam pueden aparecer síntomas parecidos a los que le llevaron a comenzar el tratamiento con alprazolam (efecto rebote).

El uso de alprazolam junto con medicamentos del tipo opioides, puede provocar sedación profunda, depresión respiratoria, coma y muerte.

REACCIONES ADVERSAS:

Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):

- Depresión.
- Sedación, somnolencia, trastorno de la coordinación (ataxia), alteración de la memoria, dificultad para articular palabras (disartria), mareo, dolor de cabeza.
- Estreñimiento, boca seca.
- Fatiga, irritabilidad.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- Sensación de confusión, desorientación, alteración del deseo sexual (libido), ansiedad, dificultad para dormir (insomnio), nerviosismo.
- Coordinación anormal, alteración del equilibrio, dificultad para concentrarse, sueño excesivo (hipersomnia), estado de somnolencia profunda y prolongada (letargia), temblor.
- Náuseas, disminución del apetito.
- Visión borrosa.
- Dermatitis.
- Disfunción sexual.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Pérdida de memoria (amnesia).
- Trastornos mentales y del comportamiento (manía), alucinaciones, reacciones de ira, agitación.
- Pérdida de fuerza en los músculos.
- Menstruación irregular.

Con el uso de las benzodiazepinas pueden aparecer:

- Somnolencia, falta de reacción ante estímulos emocionales (embotamiento afectivo), reducción del estado de alerta (pérdida de memoria), confusión, fatiga, dolor de cabeza, mareo, debilidad muscular, ataxia o visión doble, puede desenmascarar una depresión ya existente. Pueden ocurrir ocasionalmente alteraciones gastrointestinales, cambios en el deseo sexual.

Fabricado y envasado por:

SALAS PHARMACEUTICALS PVT. LTD.

Exportado por:

PRAJ LIFESCIENCE LLP.

DG 06, Gold City, Plot No. 11, Sector 19D, Vashi, Navi Mumbai: 400 703, INDIA.

Importado y distribuido por:

CASA DE REPRESENTACIÓN PHARMA COLINA C.A.

Av. Guzmán Lander, Edif. Centro de Especialidades Médicas Colina, Anexo Planta Tecnológica, Local 1, Sector Colinas del Neverí – 6001, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela.

RIF: J-50021699-8

Registro N° C/R-982